

Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society

<http://journals.cambridge.org/PSP>


Additional services for *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*:

Email alerts: [Click here](#)

Subscriptions: [Click here](#)

Commercial reprints: [Click here](#)

Terms of use : [Click here](#)



Sur les solutions friables de l'équation $a+b=c$

SARY DRAPPEAU

Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society / *FirstView* Article / January 2013, pp 1 - 25
DOI: 10.1017/S0305004112000643, Published online:

Link to this article: http://journals.cambridge.org/abstract_S0305004112000643

How to cite this article:

SARY DRAPPEAU Sur les solutions friables de l'équation $a+b=c$. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, Available on CJO doi:10.1017/S0305004112000643

Request Permissions : [Click here](#)

Sur les solutions friables de l'équation $a + b = c$

BY SARY DRAPPEAU

*Université Denis Diderot - Paris VII,
Institut de Mathématiques de Jussieu (UMR 7586)
Bâtiment Chevaleret, Bureau 7C08, 75205 Paris Cedex 13, France.
e-mail: drappeau@math.jussieu.fr*

(Received 20 March 2012; revised 9 October 2012)

Abstract

In a recent paper [5], Lagarias and Soundararajan study the y -smooth solutions to the equation $a + b = c$. Conditionally under the Generalised Riemann Hypothesis, they obtain an estimate for the number of those solutions weighted by a compactly supported smooth function, as well as a lower bound for the number of bounded unweighted solutions. In this paper, we prove a more precise conditional estimate for the number of weighted solutions that is valid when y is relatively large with respect to x , so as to connect our estimate with the one obtained by La Bretèche and Granville in a recent work [2]. We also prove, conditionally under the Generalised Riemann Hypothesis, the conjectured upper bound for the number of bounded unweighted solutions, thus obtaining its exact asymptotic behaviour.

1. Introduction

La conjecture abc formulée en 1985 par Masser et Oesterlé (voir par exemple [6]) relie la taille des solutions à l'équation

$$a + b = c \tag{1.1}$$

avec leur radical $R(a, b, c) = \prod_{p|abc} p$ de la façon suivante.

CONJECTURE 1.1. *Il existe une constante κ telle que pour tout $\varepsilon > 0$, il n'existe qu'un nombre fini de solutions (a, b, c) avec $\text{pgcd}(|a|, |b|, |c|) = 1$ à l'équation (1.1) sous la condition*

$$R(|a|, |b|, |c|) \leq \max(|a|, |b|, |c|)^{\kappa - \varepsilon}.$$

On peut approcher le problème en comptant les solutions de (1.1) suivant la taille de leurs facteurs premiers. C'est l'objet d'un travail de Lagarias et Soundararajan [4, 5]. On note respectivement $P^+(n)$ et $P^-(n)$ le plus grand et le plus petit facteur premier de n (avec les conventions $P^+(1) = 1$ et $P^-(1) = \infty$), ainsi que

$$S(x, y) = \{n \in \mathbf{N} \mid 1 \leq n \leq x \text{ et } P^+(n) \leq y\}$$

$$\Psi(x, y) = |S(x, y)|$$

$$u = u_x := \frac{\log x}{\log y}$$

$$H(u) := \exp(u / \log^2(u + 1)) \quad \text{pour } u \geq 1.$$

On note $\alpha = \alpha_x = \alpha(x, y)$ (le *point-selle*) l'unique solution positive de

$$\sum_{p \leq y} \frac{\log(p)}{p^\alpha - 1} = \log x.$$

Là où α et u sont notés sans indice, il est convenu que la valeur du premier paramètre est x . La valeur du second paramètre, elle, est toujours y . Lorsque x et y tendent vers l'infini tout en vérifiant $(\log x)^2 \leq y \leq x$, on a

$$1 - \alpha \sim \log(u + 1) / \log y.$$

On étudie le comportement asymptotique du nombre de solutions à l'équation (1.1) qui sont y -friables et de taille inférieure à x

$$N(x, y) := \sum_{\substack{a, b, c \in \mathcal{S}(x, y) \\ a+b=c}} 1$$

ainsi que du nombre de ces solutions qui sont *primitives*, c'est-à-dire avec à composantes premières entre elles

$$N^*(x, y) := \sum_{\substack{a, b, c \in \mathcal{S}(x, y) \\ (a, b, c) = 1 \\ a+b=c}} 1.$$

Le comportement asymptotique de $N(x, y)$ a été étudié par de la Bretèche et Granville dans [2] pour les grandes valeurs de y .

THÉORÈME 1.1 (La Bretèche, Granville [2, théorème 1.1]). *Soit $\varepsilon > 0$. Lorsque x et y vérifient*

$$\exp((\log x)^{2/3+\varepsilon}) \leq y \leq x$$

on a uniformément

$$N(x, y) = \frac{1}{2} \frac{\Psi(x, y)^3}{x} \left(1 + O_\varepsilon \left(\frac{\log(u + 1)}{\log y} \right) \right).$$

Dans le cadre de l'étude de la conjecture *abc* cependant, il apparaît intéressant d'obtenir des résultats valables lorsque y est de l'ordre d'une puissance de $\log x$. On travaille pour cela avec des sommes modifiées, où la condition $a, b, c \leq x$ est lissée. Étant donnée une fonction test $\Phi : \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{C}$ à support compact, on étudie le comportement du nombre de solutions pondérées

$$N(x, y; \Phi) := \sum_{\substack{P^+(abc) \leq y \\ a+b=c}} \Phi \left(\frac{a}{x} \right) \Phi \left(\frac{b}{x} \right) \Phi \left(\frac{c}{x} \right)$$

ainsi que la quantité associée pour les solutions primitives

$$N^*(x, y; \Phi) := \sum_{\substack{P^+(abc) \leq y \\ (a, b, c) = 1 \\ a+b=c}} \Phi \left(\frac{a}{x} \right) \Phi \left(\frac{b}{x} \right) \Phi \left(\frac{c}{x} \right).$$

La fonction Φ est autant que possible utilisée comme une approximation de $\mathbf{1}_{]0,1]}$, la fonction indicatrice de l'intervalle $]0,1]$.

De même que dans [5], on se place dans la situation où l'hypothèse de Riemann est vraie dans la version généralisée suivante.

CONJECTURE 1.2 (Hypothèse de Riemann généralisée). *Les zéros non triviaux de la fonction ζ de Riemann ainsi que ceux de toutes les fonctions L de Dirichlet ont pour partie réelle $1/2$.*

Si $2/3 < \alpha \leq 1$ et si Φ est de classe C^∞ par morceaux, à support compact dans \mathbf{R}_+ , alors on définit

$$\mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha) := \alpha^3 \int_0^\infty \int_0^\infty \Phi(t_1)\Phi(t_2)\Phi(t_1 + t_2)(t_1 t_2 (t_1 + t_2))^{\alpha-1} dt_1 dt_2$$

$$\mathfrak{S}_1(\alpha) := \prod_p \left(1 + \frac{p-1}{p(p^{3\alpha-1}-1)} \left(\frac{p-p^\alpha}{p-1} \right)^3 \right).$$

On note également $\mathfrak{S}_1^*(\alpha, y) := \mathfrak{S}_1(\alpha)\zeta(3\alpha-1, y)^{-1}$ et $\mathfrak{S}_1^*(\alpha) := \mathfrak{S}_1(\alpha)\zeta(3\alpha-1)^{-1}$, avec la notation, pour tout $s \in \mathbf{C}$ de partie réelle strictement positive,

$$\zeta(s, y) := \sum_{P^+(n) \leq y} n^{-s} = \prod_{p \leq y} (1 - p^{-s})^{-1}.$$

Remarquons que $\mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha)$ et $\mathfrak{S}_1(\alpha)$ sont des fonctions continues de α , on a donc en particulier

$$\mathfrak{S}_0(\mathbf{1}_{]0,1]}, \alpha)\mathfrak{S}_1(\alpha) = \frac{1}{2} + O\left(\frac{\log u}{\log y}\right)$$

THÉORÈME 1.2 (Lagarias, Soundararajan [5, théorèmes 2.1 et 2.2]). *Soit $\varepsilon > 0$ et Φ une fonction de classe C^∞ à support compact inclus dans $]0, \infty[$. Si l'hypothèse de Riemann généralisée est vraie, alors pour tous x et y vérifiant*

$$2 \leq (\log x)^{8+\varepsilon} \leq y \leq \exp((\log x)^{\frac{1}{2}-\varepsilon})$$

on a

$$N(x, y; \Phi) = \mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha)\mathfrak{S}_1(\alpha) \frac{\Psi(x, y)^3}{x} \left\{ 1 + O_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\log \log y}{\log y} \right) \right\}$$

$$N^*(x, y; \Phi) = \mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha)\mathfrak{S}_1^*(\alpha, y) \frac{\Psi(x, y)^3}{x} \left\{ 1 + O_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{1}{(\log y)^{1/4}} \right) \right\}.$$

Les termes principaux des estimations des Théorèmes 1.2 et 1.1 sont donc compatibles en vertu de la remarque précédente ; mais leurs intervalles de validités ne se rejoignent pas. En premier lieu, on présente ici une modification de l'argument de Lagarias et Soundararajan qui permet d'une part de combler cet intervalle non résolu, d'autre part d'améliorer le terme d'erreur. Définissons pour tout $\kappa \geq 1$ et $c_0 > 0$ les domaines

$$\mathcal{D}(\kappa) := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid 2 \leq (\log x)^\kappa \leq y \leq x\} \tag{1.2}$$

$$\mathcal{D}^*(\kappa, c_0) := \mathcal{D}(\kappa) \cap \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid (\log y)H(u)^{-c_0} \leq 1\} \tag{1.3}$$

Pour tous $\varepsilon, c_0 > 0$, la région $\mathcal{D}(\kappa, c_0)$ contient en particulier les couples $(x, y) \in \mathcal{D}(\kappa)$ vérifiant $y \leq \exp((\log x)/(\log \log x)^{2+\varepsilon})$, lorsque x et y sont assez grands en fonction de ε et c_0 . Notre résultat est le suivant.

THÉORÈME 1.3. *Il existe une constante absolue $c_0 > 0$ telle que pour tous $\varepsilon > 0$ et Φ de classe \mathcal{C}^∞ à support compact inclus dans $]0, \infty[$, si l'hypothèse de Riemann généralisée est vraie, alors pour tout (x, y) dans le domaine $\mathcal{D}^*(8 + \varepsilon, c_0)$ on a*

$$N(x, y; \Phi) = \mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha) \mathfrak{S}_1(\alpha) \frac{\Psi(x, y)^3}{x} \left\{ 1 + O_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{1}{u} \right) \right\} \quad (1.4)$$

$$N^*(x, y; \Phi) = \mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha) \mathfrak{S}_1^*(\alpha) \frac{\Psi(x, y)^3}{x} \left\{ 1 + O_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{1}{u} \right) \right\}. \quad (1.5)$$

On s'attend, mais ce ne sera pas étudié ici, à ce que la technique de La Bretèche et Granville [2] puisse être utilisée pour obtenir une estimation de $N(x, y; \Phi)$ valable sous les hypothèses du Théorème 1.1. Cela impliquerait que les estimations (1.4) et (1.5) soient valables dans $\mathcal{D}(8 + \varepsilon)$ tout entier. On note que, sous les hypothèses du Théorème 1.3, lorsque x et y tendent vers l'infini,

$$1 - \frac{1}{8 + \varepsilon} + o(1) \leq \alpha < 1.$$

Les termes d'erreurs du Théorème 1.3 sont de même nature que le terme d'erreur identique obtenu par Hildebrand et Tenenbaum [3] dans l'estimation de $\Psi(x, y)$ par la méthode du col.

L'hypothèse sur Φ est contraignante en cela qu'elle ne permet pas de prendre des majorants de la fonction $\mathbf{1}_{]0,1]}$ par le haut. On a en revanche comme corollaire direct les minorations asymptotiques suivantes.

THÉORÈME 1.4 (Lagarias, Soundararajan [5, corollaire des théorèmes 2.1 et 2.2]).

Soit $\varepsilon > 0$. Si l'hypothèse de Riemann généralisée est vraie, lorsque x et y tendent vers l'infini en vérifiant

$$(\log x)^{8+\varepsilon} \leq y \leq \exp((\log x)^{\frac{1}{2}-\varepsilon}), \quad \text{on a}$$

$$N(x, y) \geq \mathfrak{S}_0(\mathbf{1}_{]0,1]}, \alpha) \mathfrak{S}_1(\alpha) \frac{\Psi(x, y)^3}{x} \{1 + o_\varepsilon(1)\}$$

$$N^*(x, y) \geq \mathfrak{S}_0(\mathbf{1}_{]0,1]}, \alpha) \mathfrak{S}_1^*(\alpha) \frac{\Psi(x, y)^3}{x} \{1 + o_\varepsilon(1)\}.$$

On présente un raisonnement qui permet de parvenir aux égalités asymptotiques.

THÉORÈME 1.5. *Soit $\varepsilon > 0$. Si l'hypothèse de Riemann généralisée est vraie, lorsque $(x, y) \in \mathcal{D}(8 + \varepsilon)$ et x et y tendent vers l'infini on a*

$$N(x, y) = \mathfrak{S}_0(\mathbf{1}_{]0,1]}, \alpha) \mathfrak{S}_1(\alpha) \frac{\Psi(x, y)^3}{x} \{1 + o_\varepsilon(1)\} \quad (1.6)$$

$$N^*(x, y) = \mathfrak{S}_0(\mathbf{1}_{]0,1]}, \alpha) \mathfrak{S}_1^*(\alpha) \frac{\Psi(x, y)^3}{x} \{1 + o_\varepsilon(1)\}. \quad (1.7)$$

Deux éléments ont permis d'améliorer les résultats de Lagarias et Soundararajan : un changement dans le choix d'un contour, et l'utilisation de résultats très précis de La Bretèche et Tenenbaum [1] sur le rapport $\Psi(x/d, y)/\Psi(x, y)$.

2. Rappel de quelques résultats sur les entiers friables

Dans leur article [3], Hildebrand et Tenenbaum ont utilisé la méthode du col afin d'étudier $\Psi(x, y)$, en tirant avantage de l'identité

$$\Psi(x, y) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \zeta(s, y) x^s \frac{ds}{s} \tag{2.1}$$

valable pour tout $\sigma > 0$. Il apparaît en effet que si l'on choisit $\sigma = \alpha(x, y)$ alors la contribution principale à l'intégrale entière vient de la partie du contour autour de α , c'est-à-dire les valeurs de s ayant une petite partie imaginaire.

On note $s \mapsto \phi_2(s, y)$ la dérivée seconde de la fonction $s \mapsto \log \zeta(s, y)$. Le résultat principal de Hildebrand et Tenenbaum est contenu dans les deux lemmes suivants.

LEMME 2.1 (Hildebrand, Tenenbaum [3, lemme 10]). *Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $c_1 > 0$ tel que lorsque $(x, y) \in \mathcal{D}(1)$ on ait*

$$\Psi(x, y) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\alpha-i/\log y}^{\alpha+i/\log y} \zeta(s; y) \frac{x^s}{s} ds + O_\varepsilon \left(x^\alpha \zeta(\alpha; y) \left(H(u)^{-c_1} + \exp \{ -(\log y)^{3/2-\varepsilon} \} \right) \right).$$

LEMME 2.2 (Hildebrand, Tenenbaum [3, lemme 11]). *Lorsque $(x, y) \in \mathcal{D}(1)$ on a*

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i\pi} \int_{\alpha-i/\log y}^{\alpha+i/\log y} \zeta(s; y) \frac{x^s}{s} ds &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\alpha-i/\log y}^{\alpha+i/\log y} \left| \zeta(s; y) \frac{x^s}{s} \right| |ds| \left(1 + O \left(\frac{1}{u} \right) \right) \\ &= \frac{x^\alpha \zeta(\alpha; y)}{\alpha \sqrt{2\pi \phi_2(\alpha, y)}} \left(1 + O \left(\frac{1}{u} \right) \right). \end{aligned}$$

On dispose par ailleurs du résultat élémentaire suivant.

LEMME 2.3. *Lorsque $x \geq y \geq 2$, on a*

$$\log \zeta(\alpha, y) = u \left\{ 1 + O \left(\frac{\log \log(u+2)}{\log(u+2)} \right) \right\}.$$

Cela permet d'écrire dans le même domaine

$$\Psi(x, y) = x^{\alpha+o(1)}. \tag{2.2}$$

On reprend dans la section suivante une partie de la preuve de Hildebrand et Tenenbaum, on cite donc quelques résultats précis concernant l'estimation de l'intégrale (2.1). On se place sur la droite $\Re s = \alpha$ et on note $T_0 = u^{-1/3}/\log y$. Les points de partie imaginaire supérieure à T_0 contribuent de façon négligeable. Quant aux autres, un développement limité permet d'estimer leur contribution. Le lemme suivant permet de traiter le cas des points de partie imaginaire τ vérifiant $1/\log y \leq |\tau| \leq y$.

LEMME 2.4 (Hildebrand, Tenenbaum [3, lemme 8]). *Lorsque $1/\log y \leq |\tau| \leq y$, il existe $c_2 > 0$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathcal{D}(1)$ on ait*

$$\zeta(\alpha + i\tau; y) \ll \zeta(\alpha; y) \exp \left(-c_2 \frac{u\tau^2}{(1-\alpha)^2 + \tau^2} \right).$$

Pour les points de partie imaginaire vérifiant $T_0 \leq |\tau| \leq 1/\log y$ on utilise la majoration suivante, énoncée dans la démonstration du [3, lemme 11].

LEMME 2.5 (Hildebrand, Tenenbaum [3, démonstration du lemme 11]). *Pour tout $(x, y) \in \mathcal{D}(1)$ et $\sigma = \alpha$, on a*

$$\int_{T_0 \leq |\tau| \leq 1/\log y} \left| \zeta(s, y) \frac{x^s}{s} \right| ds \ll \frac{\Psi(x, y)}{u}.$$

Enfin, le lemme suivant est une reformulation du [3 lemme 11].

LEMME 2.6 (Hildebrand, Tenenbaum [3, lemme 4]). *On note σ_k ($2 \leq k \leq 4$) la valeur de la dérivée k -ième de la fonction $s \mapsto \log \zeta(s, y)$ en $s = \alpha$. Pour $(x, y) \in \mathcal{D}(1)$ et $s = \alpha + i\tau$ avec $|\tau| \leq T_0$ on a*

$$\log \zeta(s, y) = \log \zeta(\alpha, y) - i\tau \log x - \frac{\tau^2}{2} \sigma_2 - i \frac{\tau^3}{6} \sigma_3 + O(\tau^4 \sigma_4).$$

De plus les quantités σ_k vérifient $\sigma_k \asymp u(\log y)^k$.

On note que $\sigma_2 = \phi_2(\alpha, y)$.

Concernant le comportement local de $\Psi(x, y)$, on cite le résultat suivant, dû à La Bretèche et Tenenbaum [1].

LEMME 2.7 (La Bretèche, Tenenbaum [1, théorème 2.4]). *Il existe deux constantes absolues b_1 et b_2 et une fonction $b = b(x, y; d)$ satisfaisant $b_1 \leq b \leq b_2$ telles que pour tout $(x, y) \in \mathcal{D}(1)$ et $d \in \mathbf{N}$ avec $1 \leq d \leq x$ on ait uniformément*

$$\Psi\left(\frac{x}{d}, y\right) = \left\{ 1 + O\left(\frac{t}{u}\right) \right\} \left(1 - \frac{t^2}{u^2}\right)^{bu} \frac{\Psi(x, y)}{d^\alpha}$$

où on a posé $t = (\log d)/\log y$.

Remarquons que cela implique sous les mêmes hypothèses la majoration

$$\Psi(x/d, y) \ll \Psi(x, y)/d^\alpha.$$

On dispose avec ceci de tous les outils nécessaires pour préciser le résultat de Lagarias et Soundararajan.

3. Solutions générales pondérées

Dans ce qui suit, $\Phi : \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{C}$ désigne une fonction de classe C^∞ à support compact inclus dans $]0, \infty[$. L'objet d'étude dans cette partie est la quantité suivante

$$N(A, B, C, y; \Phi) := \sum_{\substack{P^+(abc) \leq y \\ a+b=c}} \Phi\left(\frac{a}{A}\right) \Phi\left(\frac{b}{B}\right) \Phi\left(\frac{c}{C}\right).$$

On a donc en particulier $N(x, y; \Phi) = N(x, x, x, y; \Phi)$.

3.1. Rappel des lemmes de Lagarias et Soundararajan [5]

Dans un premier temps, on rappelle les principales étapes du raisonnement de Lagarias et Soundararajan. Leur méthode se base sur la méthode du cercle. On note $e(x) = \exp(2i\pi x)$ et on pose

$$E_\Phi(x, y; \vartheta) := \sum_{P^+(n) \leq y} e(n\vartheta) \Phi\left(\frac{n}{x}\right).$$

On peut alors écrire

$$N(A, B, C, y; \Phi) = \int_0^1 E_\Phi(A, y; \vartheta) E_\Phi(B, y; \vartheta) E_\Phi(C, y; -\vartheta) d\vartheta. \quad (3.1)$$

Le but est de trouver des estimations de $E_\Phi(x, y; \vartheta)$ qui se comportent bien lorsqu'on les reporte dans l'intégrale.

Le comportement de $E_\Phi(x, y; \vartheta)$ est fortement lié aux approximations rationnelles de ϑ : ainsi, si $\vartheta = a/q + \beta$ on peut écrire (cf. [5, la démonstration de la proposition 6.1])

$$E_\Phi(x, y; \vartheta) = \sum_{\substack{d|q \\ P^+(d) \leq y}} \frac{1}{\varphi(q/d)} \sum_{\chi \pmod{q/d}} \chi(a) \tau(\bar{\chi}) \left(\sum_{P^+(m) \leq y} e(md\beta) \chi(m) \Phi\left(\frac{md}{x}\right) \right) \quad (3.2)$$

où $\tau(\bar{\chi})$ est la somme de Gauss $\sum_{b \pmod{q/d}} \bar{\chi}(b) e(b/q/d)$. [5, proposition 6.1] de [5] montre que la contribution des caractères non principaux à $E_\Phi(x, y; \vartheta)$ est négligeable. La version qu'on énonce ici se place sous des hypothèses plus générales, mais se montre de manière identique : c'est est pourquoi nous n'en donnons pas la preuve.

PROPOSITION 3.1 (Lagarias, Soundararajan [5, proposition 6.1]). *Soit $\varepsilon > 0$ et Φ une fonction de classe C^∞ à support compact inclus dans $]0, \infty[$. Si l'hypothèse de Riemann généralisée est vraie, alors lorsque les réels x, y, R et ϑ vérifient $2 \leq y \leq x \leq R$ et $\vartheta \in [0, 1]$ avec $\vartheta = a/q + \beta$ où $(a, q) = 1, q \leq R^{1/2}$ et $|\beta| \leq 1/(qR^{1/2})$, on a*

$$E_\Phi(x, y; \vartheta) = M_\Phi(x, y; q, \beta) + O_{\varepsilon, \Phi}(xR^{-1/4+\varepsilon})$$

où $M_\Phi(x, y; q, \beta)$ est défini par

$$M_\Phi(x, y; q, \beta) := \sum_{P^+(n) \leq y} \frac{\mu(q/(q, n))}{\varphi(q/(q, n))} e(n\beta) \Phi\left(\frac{n}{x}\right).$$

Cette proposition ne donne pas une bonne majoration pour des y trop petits : par exemple lorsque $y < (\log x)^{4-\varepsilon}$, la majoration triviale

$$E_\Phi(x, y; \vartheta) \ll_\Phi \Psi(x, y) = x^{\alpha+o(1)} \ll x^{3/4-\varepsilon/2}$$

est plus forte.

Le point important dans la démonstration de cette proposition est d'avoir une majoration efficace de la somme d'exponentielles

$$\Psi_0(z, y; \chi, \gamma) := \sum_{P^+(n) \leq y} e(n\gamma) \chi(n) \Phi\left(\frac{n}{z}\right)$$

lorsque χ est un caractère de Dirichlet et $\gamma \in \mathbf{R}$. On a pour tout $\sigma > 0$,

$$\Psi_0(z, y; \chi, \gamma) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} L(s, \chi; y) z^s \check{\Phi}(\gamma z, s) ds$$

où l'on a noté

$$L(s, \chi; y) := \sum_{P^+(n) \leq y} \chi(n) n^{-s} = \prod_{p \leq y} (1 - \chi(p) p^{-s})^{-1}$$

$$\check{\Phi}(\lambda, s) := \int_0^\infty \Phi(t) e(\lambda t) t^{s-1} dt.$$

Afin de majorer Ψ_0 , il nous suffit d'avoir de bonnes majorations de $L(s, \chi; y)$ et $\check{\Phi}(\lambda, s)$ puis de les reporter dans l'intégrale. Les majorations dont on dispose sont les suivantes.

PROPOSITION 3-2 (Lagarias, Soundararajan [5, proposition 5.1]). *Soit $\varepsilon > 0$, si l'hypothèse de Riemann généralisée est vraie, alors pour tout caractère χ modulo q et tout $s \in \mathbf{C}$ avec $s = \sigma + i\tau$ et $1/2 + \varepsilon \leq \sigma \leq 3/2$, là où l'une quelconque des deux conditions suivantes est vérifiée:*

- (i) χ est non principal,
- (ii) χ est principal et $\tau > y^{1-\sigma}$,

on a

$$L(s, \chi; y) \ll_\varepsilon (q|\tau|)^\varepsilon.$$

PROPOSITION 3-3 (Lagarias, Soundararajan 5, lemmes 3.3 et 3.5). *Soit $k \geq 0$ et Φ une fonction de classe C^∞ à support compact inclus dans $]0, \infty[$. Pour tous $\lambda \in \mathbf{R}$ et $s \in \mathbf{C}$ que l'on écrit $\sigma + i\tau$ avec $\sigma \geq 1/4$ on a*

$$|\check{\Phi}(\lambda, s)| \ll_{k, \Phi} \min \left(\left(\frac{1 + |\lambda|}{|s|} \right)^k, \left(\frac{1 + |s|}{|\lambda|} \right)^k \right).$$

De plus, soit $\varepsilon > 0$ et $\delta \geq 0$. Lorsque $\lambda \in \mathbf{R}$, on a

$$\int_{-\infty}^\infty |\check{\Phi}(\lambda, s)| (1 + |\tau|)^\delta d\tau \ll_{\Phi, \sigma, \varepsilon} (1 + |\lambda|)^{1/2 + \delta + \varepsilon}.$$

Il reste alors à traiter le terme principal $M_\Phi(x, y; q, \beta)$. On se ramène au cas $P^+(q) \leq y$ en écrivant $q = q_0 q_1$ avec $P^+(q_0) \leq y$ et $P^-(q_1) > y$. Il vient

$$M_\Phi(x, y; q, \beta) = \frac{\mu(q_1)}{\varphi(q_1)} M_\Phi(x, y; q_0, \beta).$$

Définissons

$$\tilde{M}_\Phi(x, y; q_0, \beta) := \alpha q_0^{-\alpha} \prod_{p|q_0} \left(1 - \frac{p^\alpha - 1}{p - 1} \right) \check{\Phi}(\beta x, \alpha) \Psi(x, y).$$

L'estimation de $M_\Phi(x, y; q_0, \beta)$ est l'objet de la proposition suivante de Lagarias et Soundararajan. De même que la Proposition 3.1, nous l'énonçons sous des hypothèses plus générales, mais la démonstration reste identique.

PROPOSITION 3.4 (Lagarias, Soundararajan [5, proposition 6.3]). Soient $\delta > 0$, $\varepsilon > 0$ et Φ une fonction de classe C^∞ à support compact inclus dans $]0, \infty[$. Si l'hypothèse de Riemann généralisée est vraie, alors lorsque les réels x, y, R, q_0 et β vérifient

$$2 \leq (\log x)^{2+\varepsilon} \leq y \leq x \leq R, q_0 \in S(R^{1/2}, y) \text{ et } \beta \in [-1/(q_0 R^{1/2}), 1/(q_0 R^{1/2})]$$

on a:

(i) si $x = R$ et $|\beta| \geq R^{\delta-1}$ alors

$$|M_\Phi(x, y; q_0, \beta)| \ll_{\varepsilon, \delta, \Phi} x^{3/4+\varepsilon} q_0^{-1};$$

(ii) si $|\beta| \leq R^{\delta-1}$ et si de plus $y \leq \exp((\log x)^{1/2-\varepsilon})$,

$$M_\Phi(x, y; q_0, \beta) = \tilde{M}_\Phi(x, y; q_0, \beta) + O_{\varepsilon, \delta, \Phi}(x^{1/2+\varepsilon} q_0^{-1} R^{1/4+\varepsilon}) + O_{\varepsilon, \Phi}\left(\frac{q_0^{-\alpha+\varepsilon} \Psi(x, y)}{(1 + |\beta|x)^2 (\log y)}\right).$$

Le reste du raisonnement consiste alors à reporter ces estimations dans l'intégrale (3.1).

On s'intéresse au deuxième cas de la Proposition 3.4, car c'est lui qui dicte le terme d'erreur et la limite supérieure en y : $(\log y)H(u)^{-c_0} \leq 1$ du domaine de validité du Théorème 1.3.

3.2. Estimation de $M_\Phi(x, y; q_0, \beta)$

On démontre ici la proposition suivante, qui est une version plus précise de [5, proposition 6.3].

PROPOSITION 3.5. Il existe une constante $c_0 > 0$ telle que si l'hypothèse de Riemann généralisée est vraie, pour tout $\delta > 0$ et toute fonction Φ de classe C^∞ à support compact inclus dans $]0, \infty[$, lorsque les réels x, y, R, q_0 et β vérifient

$$(x, y) \in \mathcal{D}^*(1, c_0), x \leq R, q_0 \in S(R^{1/2}, y) \text{ et } \beta \in [-R^{\delta-1}, R^{\delta-1}]$$

on ait

$$M_\Phi(x, y; q_0, \beta) = \tilde{M}_\Phi(x, y; q_0, \beta) + O_{\delta, \Phi}(x q_0^{-1/2} R^{-1/2+\delta}) + O_{\delta, \Phi}\left(\frac{q_0^{-\alpha+\delta} \Psi(x, y)}{(1 + |\beta|x)u}\right). \quad (3.3)$$

Proof. Soit c_0 un réel vérifiant $0 < c_0 < \min(c_1/2, c_2/8)$, où c_1 et c_2 sont les constantes des Lemmes 2.1 et 2.4. On choisit x, y, R, q_0 et β comme dans l'énoncé. On part de l'identité suivante valable pour tout $\sigma > 0$, obtenue en appliquant une transformation de Mellin,

$$M_\Phi(x, y; q_0, \beta) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \zeta(s; y, q_0) x^s \check{\Phi}(\beta x, s) ds \quad (3.4)$$

avec la notation

$$\zeta(s; y, q_0) = \sum_{p^+(n) \leq y} \frac{\mu(q_0/(q_0, n))}{\varphi(q_0/(q_0, n))} n^{-s}.$$

On remarque que l'on a

$$\zeta(s; y, q_0) = q_0^{-s} \prod_{p|q_0} \left(1 - \frac{p^s - 1}{p - 1}\right) \zeta(s; y).$$


On suit la méthode du col afin d'estimer l'intégrale qui apparaît dans (3.4). Posons

$s = \sigma + i\tau$. L'abscisse d'intégration est déplacée en $\sigma = \alpha$ pour les τ petits. Pour les plus grandes valeurs de τ , on se déplace progressivement vers la droite $\sigma = 1/2$ où le facteur x^s a moins d'importance, en tirant avantage de l'hypothèse de Riemann.

Soit $\varepsilon > 0$. On intègre sur le contour $\bigcup_{j=1}^7 C_j$ où:

- (i) C_1 est la demi-droite $]1/2 + \varepsilon - i\infty, 1/2 + \varepsilon - iy^{1/2-\varepsilon}]$;
 - (ii) C_2 est le chemin $\{1 - (\log(-\tau))/\log y + i\tau, \tau \in [-y^{1/2-\varepsilon}, -y^{1-\alpha}]\}$;
 - (iii) C_3 est le segment $[\alpha - iy^{1-\alpha}, \alpha - i/\log y]$;
 - (iv) C_4 est le segment $[\alpha - i/\log y, \alpha + i/\log y]$;
 - (v) C_5 est le segment $[\alpha + i/\log y, \alpha + iy^{1-\alpha}]$;
 - (vi) C_6 est le chemin $\{1 - (\log \tau)/\log y + i\tau, \tau \in [y^{1-\alpha}, y^{1/2-\varepsilon}]\}$;
 - (vii) C_7 est la demi-droite $]1/2 + \varepsilon - i\infty, 1/2 + \varepsilon - iy^{1/2-\varepsilon}]$,
- chacun de ces chemins étant parcouru par parties imaginaires croissantes, et on note

$$I_j = I_j(\beta) := \frac{1}{2i\pi} \int_{C_j} \zeta(s; y, q_0) x^s \check{\Phi}(\beta x, s) ds.$$



Sur le segment C_7 , les Propositions 3.2 et 3.3 fournissent,

$$\zeta(s; y, q_0) \ll_{\varepsilon} q_0^{-1/2+\varepsilon} \tau^{\varepsilon} \text{ et } x^s \ll x^{1/2+\varepsilon}.$$

De plus,

$$\int_{|\tau| > y^{1/2-\varepsilon}} |\check{\Phi}(\beta x, 1/2 + \varepsilon + i\tau)| \tau^{\varepsilon} \ll_{\varepsilon, \Phi} (1 + |\beta|x)^{1/2+2\varepsilon}.$$

Donc quitte à prendre $\varepsilon < \delta/(2 + 4\delta)$,

$$I_1 \ll_{\delta, \Phi} x q_0^{-1/2} R^{-1/2+\delta}.$$

Sur le segment C_6 , on intègre suivant σ . On a

$$I_6 = \frac{1}{2i\pi} \int_{1/2+\varepsilon}^{\alpha} \zeta(\sigma + iy^{1-\sigma}; y, q_0) x^{\sigma + iy^{1-\sigma}} \check{\Phi}(\beta x, \sigma + iy^{1-\sigma}) (i(\log y) y^{1-\sigma} - 1) d\sigma.$$

On a les majorations

$$\zeta(s; y, q_0) \ll_{\delta} q_0^{-\sigma+\delta/2} |\zeta(s; y)| \ll_{\delta} q_0^{-\sigma+\delta} y^{\delta(1-\sigma)}$$

$$\check{\Phi}(\beta x, s) \ll_{\Phi} \frac{y^{1-\sigma}}{1 + |\beta|x}$$

$$i(\log y)y^{1-\sigma} - 1 \ll (\log y)y^{1-\sigma}.$$

En reportant dans l'intégrale, on obtient pour une certaine constante $c_3 > 0$,

$$\begin{aligned} I_6 &\ll_{\delta, \Phi} \frac{q_0^{\delta} \log y}{1 + |\beta|x} \int_{1/2+\varepsilon}^{\alpha} q_0^{-\sigma} x^{\sigma} y^{(2+\delta)(1-\sigma)} d\sigma \\ &\ll \frac{x^{\alpha}}{\log x} \frac{q_0^{-\alpha+\delta}}{1 + |\beta|x} (\log y) y^{(2+\delta)(1-\alpha)} \\ &\ll \frac{x^{\alpha} \zeta(\alpha; y)}{\sqrt{u} \log y} \frac{q_0^{-\alpha+\delta}}{1 + |\beta|x} \frac{\log y}{\sqrt{u}} (u \log u)^{2+\delta} \exp(-c_3 u) \\ &\ll \frac{x^{\alpha} \zeta(\alpha; y)}{\sqrt{u} \log y} \frac{q_0^{-\alpha+\delta}}{1 + |\beta|x} \exp\left(-\frac{c_3}{2} u\right). \end{aligned}$$

La contribution du chemin C_6 est donc largement un terme d'erreur acceptable.

La contribution du segment C_5 s'écrit

$$I_5 = \frac{1}{2i\pi} \int_{1/\log y}^{y^{1-\alpha}} \zeta(\alpha + i\tau; y, q_0) x^{\alpha+i\tau} \check{\Phi}(\beta x, \alpha + i\tau) d\tau.$$

On utilise le Lemme 2.4. On dispose pour $\tau \in [1/\log y, y^{1-\alpha}]$ de la majoration

$$\begin{aligned} |\zeta(s; y)| &\leq \zeta(\alpha; y) \exp\left(-c_2 u \frac{\tau^2}{(1-\alpha)^2 + \tau^2}\right) \\ &\leq \zeta(\alpha; y) \exp\left(-c_2 u \frac{1}{((1-\alpha) \log y)^2 + 1}\right) \\ &\leq \zeta(\alpha; y) H(u)^{-c_2/2}. \end{aligned}$$

On a donc

$$\begin{aligned} I_5 &\ll_{\delta} x^{\alpha} \zeta(\alpha; y) H(u)^{-c_2/2} q_0^{-\alpha+\delta} \int_{1/(\log y)}^{y^{1-\alpha}} |\check{\Phi}(\beta x, \alpha + i\tau)| d\tau \\ &\ll_{\delta, \Phi} x^{\alpha} \zeta(\alpha; y) H(u)^{-c_2/2} q_0^{-\alpha+\delta} \frac{y^{2(1-\alpha)}}{1 + |\beta|x}. \end{aligned}$$

L'intégrale sur $\check{\Phi}$ est évaluée grâce à la Proposition 3.3, en distinguant suivant $|\beta|x \leq y^{1-\alpha}$ ou $|\beta|x > y^{1-\alpha}$. Finalement, en utilisant $y^{1-\alpha} \sim u \log u$ et d'après l'hypothèse $c_0 < c_2/8$, on obtient

$$\begin{aligned} I_5 &\ll_{\delta, \Phi} \frac{x^{\alpha} \zeta(\alpha; y)}{\sqrt{u} \log y} \frac{q_0^{-\alpha+\delta}}{1 + |\beta|x} \exp\left(-c_2/2 \frac{u}{(\log u)^2} + 1/2 \log u + 2 \log(u \log u) + \log \log y\right) \\ &\ll \frac{x^{\alpha} \zeta(\alpha; y)}{\sqrt{u} \log y} \frac{q_0^{-\alpha+\delta}}{1 + |\beta|x} H(u)^{-c_2/8}. \end{aligned}$$

Ainsi I_5 est de l'ordre du terme d'erreur annoncé.

Sur le segment \mathcal{C}_4 , la quantité à estimer est

$$I_4 := \frac{1}{2\pi} \int_{-1/\log y}^{1/\log y} \zeta(\alpha + i\tau; y, q_0) x^{\alpha+i\tau} \check{\Phi}(\beta x, \alpha + i\tau) d\tau.$$

On sépare l'intégrale en deux, selon la position de $|\tau|$ par rapport à $T_0 = 1/(u^{1/3} \log y)$. D'après le Lemme 2.5, on a

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i\pi} \int_{T_0 \leq |\tau| \leq 1/\log y} \zeta(s; y, q_0) x^s \check{\Phi}(\beta x, s) ds &\ll_{\delta, \Phi} \frac{q_0^{-\alpha+\delta}}{1 + |\beta|x} \int_{T_0 \leq |\tau| \leq 1/\log y} |\zeta(s; y) x^s| ds \\ &\ll \Psi(x, y) \frac{q_0^{-\alpha+\delta}}{(1 + |\beta|x)u}. \end{aligned}$$

Pour l'autre partie de l'intégrale, le Lemme 2.6 fournit le développement de Taylor suivant, valable pour $|\tau| \leq T_0$,

$$\zeta(s; y) \frac{x^s}{s} = \frac{x^\alpha \zeta(\alpha; y)}{\alpha} e^{-\tau^2 \sigma_2 / 2} \left(1 - i \frac{\tau}{\alpha} - i \frac{\tau^3}{3!} \sigma_3 + O(\tau^6 \sigma_3^2 + \tau^2 + \tau^4 \sigma_4) \right).$$

Pour traiter le facteur restant dans l'intégrale, on note

$$f(\tau) := s q_0^{-s} \prod_{p|q_0} \left(1 - \frac{p^s - 1}{p - 1} \right) \check{\Phi}(\beta x, s).$$

En remarquant que pour tout $k \in \mathbf{N}$, l'application $t \mapsto (\log t)^k \Phi(t)$ est également \mathcal{C}^∞ de même support que Φ , on déduit

$$\begin{aligned} \check{\Phi}(\beta x, \alpha) &\ll_{\Phi} \frac{1}{1 + |\beta|x} \\ \frac{\partial \check{\Phi}}{\partial s}(\beta x, \alpha) &\ll_{\Phi} \frac{1}{1 + |\beta|x} \\ \sup_{|\tau| \leq T_0} \left| \frac{\partial^2 \check{\Phi}}{\partial s^2}(\beta x, s) \right| &\ll_{\Phi} \frac{1}{1 + |\beta|x} \end{aligned}$$

ce qui entraîne

$$|f(0)| + |f'(0)| + \sup_{|\tau| \leq T_0} |f''(\tau)| \ll_{\delta, \Phi} q_0^{-\alpha+\delta} / (1 + |\beta|x).$$

On a donc pour $|\tau| \leq T_0$,

$$f(\tau) = f(0) + f'(0)\tau + O_{\delta, \Phi} \left(\frac{q_0^{-\alpha+\delta}}{1 + |\beta|x} \tau^2 \right).$$

Ainsi lorsque l'on multiplie ce développement limité avec celui de $\zeta(s; y) x^s / s$, on obtient

$$\begin{aligned} \zeta(s; y, q_0) x^s \check{\Phi}(\beta x, s) &= \frac{x^\alpha \zeta(\alpha; y)}{\alpha} e^{-\tau^2 \sigma_2 / 2} \\ &\quad \times \left(f(0) + \lambda \tau + \mu \tau^3 + O_{\delta, \Phi} \left((\tau^2 + \sigma_3^2 \tau^6 + \sigma_4 \tau^4) \frac{q_0^{-\alpha+\delta}}{1 + |\beta|x} \right) \right) \end{aligned}$$

où les coefficients λ et μ dépendent au plus de x , y , q_0 et δ . En intégrant cette expression

pour $|\tau| \leq T_0$, on obtient

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i\pi} \int_{|\tau| \leq T_0} \zeta(s; y, q_0) x^s \check{\Phi}(\beta x, s) ds &= \frac{x^\alpha \zeta(\alpha; y)}{2\pi\alpha} f(0) \int_{|\tau| \leq T_0} e^{-\tau^2 \sigma_2 / 2} d\tau \\ &+ \frac{x^\alpha \zeta(\alpha; y)}{2\pi\alpha} \frac{q_0^{-\alpha+\delta}}{1+|\beta|x} \int_{|\tau| \leq T_0} e^{-\tau^2 \sigma_2 / 2} O_{\delta, \Phi}(\tau^2 + \sigma_3^2 \tau^6 + \sigma_4 \tau^4) d\tau. \end{aligned}$$

Le premier terme du membre de droite vaut

$$f(0) \frac{x^\alpha \zeta(\alpha; y)}{\alpha \sqrt{2\pi\sigma_2}} \left(1 + O\left(\frac{1}{u}\right) \right).$$

Quant au deuxième, la majoration $\int_{\mathbf{R}} |\tau|^k \exp(-\tau^2 \sigma_2 / 2) d\tau \ll_k \sigma_2^{-(k+1)/2}$ permet d'écrire qu'il est

$$\ll_{\delta, \Phi} \frac{x^\alpha \zeta(\alpha; y)}{\sqrt{\sigma_2} \alpha} (\sigma_2^{-1} + \sigma_3^2 \sigma_2^{-3} + \sigma_4 \sigma_2^{-2}) \frac{q_0^{-\alpha+\delta}}{1+|\beta|x} \ll \frac{x^\alpha \zeta(\alpha; y) q_0^{-\alpha+\delta}}{\alpha u \sqrt{\sigma_2} (1+|\beta|x)}$$

en utilisant l'approximation $\sigma_k \asymp u(\log y)^k$ ($2 \leq k \leq 4$) énoncée au Lemme 2.6.

On obtient donc

$$I_4 = \alpha q_0^{-\alpha} \prod_{p|q_0} \left(1 - \frac{p^\alpha - 1}{p - 1} \right) \check{\Phi}(\beta x, \alpha) \frac{x^\alpha \zeta(\alpha; y)}{\alpha \sqrt{2\pi\sigma_2}} + O_{\delta, \Phi} \left(\frac{q_0^{-\alpha+\delta} x^\alpha \zeta(\alpha; y)}{u^{3/2} (\log y) (1+|\beta|x)} \right).$$

On utilise maintenant les Lemmes 2.1 et 2.2, en vérifiant que les termes d'erreurs sont acceptables. Quitte à se restreindre à $\varepsilon < 3/2$ et d'après l'hypothèse $c_0 < c_1/2$, où c_1 est la constante du Lemme 2.1, on a

$$\exp((\log y)^{3/2-\varepsilon}) \gg u \sqrt{u} \log y$$

$$H(u)^{c_1} \gg u \sqrt{u} H(u)^{c_1/2} \gg u \sqrt{u} \log y.$$

Il vient

$$I_4 = \alpha q_0^{-\alpha} \prod_{p|q_0} \left(1 - \frac{p^\alpha - 1}{p - 1} \right) \check{\Phi}(\beta x, \alpha) \Psi(x, y) + O_{\delta, \Phi} \left(\frac{\Psi(x, y) q_0^{-\alpha+\delta}}{(1+|\beta|x)u} \right).$$

Pour $j \in \{1, 2, 3\}$, on a $I_j(\beta) = \overline{I_{8-j}}(-\beta)$; en appliquant les majoration de I_{8-j} et en combinant toutes les estimations obtenues on obtient la formule voulue.

3.3. Estimation de $N(A, B, C, y; \Phi)$

On applique à présent la méthode du cercle comme dans [5] en utilisant l'estimation de la Proposition 3.5. Pour toutes les valeurs de A, B, C telles que $2/3 < \alpha_A, \alpha_B, \alpha_C < 1$, on définit les quantités suivantes

$$\mathfrak{S}_0 = \mathfrak{S}_0(\Phi; A, B, C, y)$$

$$:= \alpha_A \alpha_B \alpha_C \int_0^\infty \int_0^\infty \Phi(t_1) \Phi(t_2) \Phi\left(\frac{A}{C} t_1 + \frac{B}{C} t_2\right) t_1^{\alpha_A-1} t_2^{\alpha_B-1} \left(\frac{A}{C} t_1 + \frac{B}{C} t_2\right)^{\alpha_C-1} dt_1 dt_2 \quad (3.5)$$

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_1(A, B, C, y) := \prod_p \left(1 + \frac{(p-1)(p-p^{\alpha_A})(p-p^{\alpha_B})(p-p^{\alpha_C})}{p(p^{\alpha_A+\alpha_B+\alpha_C-1}-1)(p-1)^3} \right).$$

THÉORÈME 3.1. *Il existe une constante absolue $c_0 > 0$ telle que pour tout $\varepsilon > 0$ et Φ une fonction de classe C^∞ à support compact inclus dans $]0, \infty[$, il existe un réel $\eta = \eta(\varepsilon) > 0$ qui tend vers 0 avec ε tel que pour tous (A, y) , (B, y) et (C, y) dans le domaine $\mathcal{D}^*(4+\eta, c_0)$ avec $C^\varepsilon \leq A \leq B \leq C$ on ait*

$$N(A, B, C, y; \Phi) = \mathfrak{S}_0 \mathfrak{S}_1 \frac{\Psi(A, y) \Psi(B, y) \Psi(C, y)}{C} + O_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\Psi(A, y) \Psi(B, y) \Psi(C, y)}{u_A C} + C^{3/4+\varepsilon} \sqrt{\Psi(A, y) \Psi(C, y)} \right). \quad (3.6)$$

Avant de prouver ce théorème, on montre qu'il implique l'estimation (1.4).

Démonstration de la première assertion du Théorème 1.3. Soit $\varepsilon > 0$. Le Théorème 3.1 dans le cas $A = B = C$ assure l'existence d'une constante absolue $c_0 > 0$ et d'un réel $\eta = \eta(\varepsilon)$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathcal{D}^*(4 + \eta, c_0)$, on ait

$$N(x, y; \Phi) = \mathfrak{S}_0(\Phi; \alpha) \mathfrak{S}_1(\alpha) \frac{\Psi(x, y)^3}{x} + O_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{ux} + x^{3/4+\varepsilon} \Psi(x, y) \right).$$

On choisit $\varepsilon \leq 1/48$ et tel que $4 + \eta(\varepsilon) \leq 8$. On vérifie alors que pour $(x, y) \in \mathcal{D}(8 + 384\varepsilon, c_0)$, on a

$$x^{3/4+\varepsilon} \Psi(x, y) \ll_\varepsilon \frac{\Psi(x, y)^3}{x^{1+\varepsilon}} \quad (3.7)$$

ce qui implique l'estimation (1.4) en vertu de $u \ll_\varepsilon x^\varepsilon$.

Démonstration du Théorème 3.1. Ce qui suit reprend en grande partie la démonstration du [5, théorème 2.1]. Soit c_0 la constante absolue donnée par la Proposition 3.5. On se place dans les hypothèses de l'énoncé. On suppose que $C \ll_\Phi B$: dans le cas contraire, le membre de gauche et le terme principal du membre de droite de (3.6) sont tous les deux nuls. On désigne par x une quantité générique telle que $(x, y) \in \mathcal{D}^*(4, c_0)$, c'est-à-dire qui puisse jouer le rôle de A, B et C . Enfin, on note que l'hypothèse $C^\varepsilon \leq A \leq B \leq C$ implique $\alpha_A = \alpha_B + o_\varepsilon(1) = \alpha_C + o_\varepsilon(1)$ lorsque A, B et C tendent vers l'infini.

On définit les arcs majeurs comme dans [5]. Soit $\delta > 0$. Pour tout $q \leq C^{1/4}$ et a premier avec q avec $0 \leq a < q$, on définit $\mathfrak{M}(a, q)$ pour $q > 1$ comme l'ensemble des $\vartheta \in [0, 1]$ tels que $|\vartheta - a/q| \leq C^{\delta-1}$, et pour $q = 1$ comme l'ensemble $[0, C^{\delta-1}] \cup [1 - C^{\delta-1}, 1]$. Un réel de l'intervalle $[0, 1]$ appartient à au plus un tel ensemble. On note \mathfrak{M} la réunion de tous les $\mathfrak{M}(a, q)$ pour $q \geq 1$ et $0 \leq a < q$, $(a, q) = 1$, et $m = [0, 1] \setminus \mathfrak{M}$.

Ainsi qu'il est montré dans la preuve du [5, théorème 2.1], on a $E_\Phi(C, y; \vartheta) \ll_{\varepsilon, \Phi} C^{3/4+\varepsilon}$ pour tout $\vartheta \in m$. On a donc par l'inégalité de Cauchy–Schwarz

$$\begin{aligned} \int_m E_\Phi(A, y; \vartheta) E_\Phi(B, y; \vartheta) E_\Phi(C, y; -\vartheta) d\vartheta \\ \ll_{\varepsilon, \Phi} C^{3/4+\varepsilon} \int_0^1 |E_\Phi(A, y; \vartheta)| |E_\Phi(B, y; -\vartheta)| d\vartheta \\ \ll C^{3/4+\varepsilon} \sqrt{\Psi(A, y) \Psi(B, y)}. \end{aligned}$$

On examine maintenant les arcs majeurs. En utilisant trois fois la Proposition 3.1, on

obtient pour $\vartheta \in \mathfrak{M}(a, q)$ avec $q \leq C^{1/4}$ et $\vartheta = a/q + \beta$,

$$\begin{aligned} E_\Phi(A, y; \vartheta)E_\Phi(B, y; \vartheta)E_\Phi(C, y; -\vartheta) &= M_\Phi(A, y; q, \beta)M_\Phi(B, y; q, \beta) \\ &\times M_\Phi(C, y; q, -\beta) + O_{\varepsilon, \Phi} \left(B^{3/4+\varepsilon/2} |E_\Phi(A, y; \vartheta)||E_\Phi(C, y; \vartheta)| \right. \\ &+ A^{3/4+\varepsilon/2} |M_\Phi(B, y; q, \beta)||E_\Phi(C, y; \vartheta)| \\ &\left. + C^{3/4+\varepsilon/2} |M_\Phi(B, y; q, \beta)||M_\Phi(A, y; q, \beta)| \right). \end{aligned} \quad (3.8)$$

Avant d'intégrer ceci pour $|\beta| \leq C^{\delta-1}$ et sommer pour $q \leq C^{1/4}$, on montre la majoration suivante

$$I = I(x, y; C, q_0) := \int_{-C^{\delta-1}}^{C^{\delta-1}} |M_\Phi(x, y; q_0, \beta)|^2 d\beta \ll_{\varepsilon, \Phi} q_0^{-1-\alpha+\varepsilon/3} (\log x) \Psi(x, y) \quad (3.9)$$

où $P^+(q_0) \leq y$. Par définition de $M_\Phi(x, y; q_0, \beta)$ on a

$$\begin{aligned} I &= 2 \sum_{P^+(n) \leq y} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, n)}\right)^2} \Phi\left(\frac{n}{x}\right)^2 C^{\delta-1} \\ &+ 2 \Re \left(\sum_{P^+(n) \leq y} \sum_{\substack{m \geq n+1 \\ P^+(m) \leq y}} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, n)}\right)} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, m)}\right)} \Phi\left(\frac{n}{x}\right) \Phi\left(\frac{m}{x}\right) h(m-n) \right) \end{aligned}$$

où $h(r) = (e(rC^{\delta-1}) - e(-rC^{\delta-1}))/r$. On a pour tout $r \geq 1$, $h(r) \ll C^{\delta-1}/(1+rC^{\delta-1})$. On note I_1 et I_2 les deux sommes de cette estimation. On a

$$\begin{aligned} I_1 &\ll C^{\delta-1} \sum_{d|q_0} \frac{1}{\varphi(q_0/d)^2} \sum_{P^+(n') \leq y} \Phi(n'd/x)^2 \\ &\ll_{\Phi} C^{\delta-1} \sum_{d|q_0} \frac{1}{d^\alpha \varphi(q_0/d)^2} \Psi(x, y) \ll C^{\delta-1} q_0^{-\alpha} \Psi(x, y). \end{aligned}$$

On note en effet que si le support de Φ est inclus dans $[0, K]$

$$\sum_{P^+(n') \leq y} \Phi(n'd/x) \ll_{\Phi} \Psi(Kx/d, y) \ll_{\Phi} \Psi(x, y)/d^\alpha.$$

On écrit I_2 en divisant la somme en deux selon la taille de $m - n$ par rapport à $C^{1-\delta}$:

$$\begin{aligned} I_2 &\ll C^{\delta-1} \sum_{P^+(n) \leq y} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, n)}\right)} \Phi\left(\frac{n}{x}\right) \sum_{\substack{n+1 \leq m \leq n+C^{1-\delta} \\ P^+(m) \leq y}} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, m)}\right)} \Phi\left(\frac{m}{x}\right) \\ &+ \sum_{P^+(n) \leq y} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, n)}\right)} \Phi\left(\frac{n}{x}\right) \sum_{\substack{m > n+C^{1-\delta} \\ P^+(m) \leq y}} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, m)}\right)} \Phi\left(\frac{m}{x}\right) \frac{1}{m-n}. \end{aligned}$$

On note $I_{2,1}$ et $I_{2,2}$ les sommes qui apparaissent au membre de droite. On a d'une part

$$\begin{aligned}
I_{2,1} &\leq \sum_{P^+(n) \leq y} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, n)}\right)} \Phi\left(\frac{n}{x}\right) \sum_{d|q_0} \frac{1}{\varphi(q_0/d)} C^{\delta-1} \sum_{\frac{n+1}{d} \leq m \leq \frac{n+C^{1-\delta}}{d}} \Phi\left(\frac{m'd}{x}\right) \\
&\ll \sum_{P^+(n) \leq y} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, n)}\right)} \Phi\left(\frac{n}{x}\right) \sum_{d|q_0} \frac{1}{d\varphi(q_0/d)} \\
&\ll_{\varepsilon} q_0^{-1+\varepsilon/4} \sum_{P^+(n) \leq y} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, n)}\right)} \Phi\left(\frac{n}{x}\right) \\
&\leq q_0^{-1+\varepsilon/4} \sum_{d|q_0} \frac{1}{\varphi(q_0/d)} \sum_{P^+(n') \leq y} \Phi\left(\frac{n'd}{x}\right) \\
&\ll_{\Phi} q_0^{-1+\varepsilon/4} \Psi(x, y) \sum_{d|q_0} \frac{1}{d^{\alpha} \varphi(q_0/d)} \\
&\ll_{\varepsilon} q_0^{-1-\alpha+\varepsilon/3} \Psi(x, y)
\end{aligned}$$

et d'autre part, si le support de Φ est inclus dans $[0, K]$,

$$\begin{aligned}
I_{2,2} &\ll_{\Phi} \sum_{P^+(n) \leq y} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, n)}\right)} \Phi\left(\frac{n}{x}\right) \sum_{n+C^{1-\delta} \leq m \leq Kx} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, m)}\right)} \frac{1}{m-n} \\
&\leq \sum_{P^+(n) \leq y} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, n)}\right)} \Phi\left(\frac{n}{x}\right) \sum_{d|q_0} \frac{1}{\varphi(q_0/d)} \sum_{\frac{n+C^{1-\delta}}{d} \leq m' \leq \frac{Kx}{d}} \frac{1}{m'd-n}.
\end{aligned}$$

La somme en m' peut être majorée par

$$\int_{\frac{n+C^{1-\delta}}{d}-1}^{\frac{Kx}{d}} \frac{dt}{dt-n} = \frac{1}{d} \int_{C^{1-\delta}-d}^{Kx-n} \frac{dt}{t} \ll_{\Phi} \frac{1}{d} \log x$$

en vertu de $d \leq q_0 \leq C^{1/4} = o(C^{1-\delta})$ pour δ assez petit. Il vient

$$\begin{aligned}
I_{2,2} &\ll_{\Phi} \log x \sum_{P^+(n) \leq y} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, n)}\right)} \Phi\left(\frac{n}{x}\right) \sum_{d|q_0} \frac{1}{d\varphi(q_0/d)} \\
&\ll_{\varepsilon} q_0^{-1+\varepsilon/4} (\log x) \sum_{P^+(n) \leq y} \frac{1}{\varphi\left(\frac{q_0}{(q_0, n)}\right)} \Phi\left(\frac{n}{x}\right) \\
&\ll_{\Phi} q_0^{-1+\varepsilon/4} (\log x) \Psi(x, y) \sum_{d|q_0} \frac{1}{d^{\alpha} \varphi(q_0/d)} \\
&\ll_{\varepsilon} q_0^{-1-\alpha+\varepsilon/3} (\log x) \Psi(x, y).
\end{aligned}$$

On a donc, en tenant compte de $q_0 \leq C^{1/4}$,

$$I \ll_{\varepsilon, \Phi} q_0^{-1-\alpha+\varepsilon/3} (\log x) \Psi(x, y).$$

À propos du terme en q_0 , on note qu'en sommant sur $q \leq C^{1/4}$ on a

$$\sum_{q \leq C^{1/4}} \frac{\varphi(q_0)}{\varphi(q_1)} q_0^{-1-\alpha+\varepsilon/3} \leq \left(\sum_{q_0 \in S(C^{1/4}, y)} \varphi(q_0) q_0^{-1-\alpha+\varepsilon/3} \right) \left(\sum_{q_1 \leq C^{1/4}} \varphi(q_1)^{-1} \right) \ll_{\varepsilon} C^{\varepsilon/3} \quad (3.10)$$

où on écrit de manière unique $q = q_0 q_1$ avec $P^+(q_0) \leq y$ et $P^-(q_1) > y$. La somme sur q_0 est traitée par une sommation d'Abel, grâce à l'estimation (2.2).

On intègre maintenant les termes d'erreur de (3.8) sur les arcs majeurs. On a un premier terme

$$\ll_{\varepsilon, \Phi} B^{3/4+\varepsilon/2} \int_{\mathfrak{M}} |E_{\Phi}(A, y; \vartheta)| |E_{\Phi}(C, y; \vartheta)| d\vartheta \leq B^{3/4+\varepsilon/3} \sqrt{\Psi(A, y)\Psi(C, y)}.$$

En utilisant $|M_{\Phi}(B, y; q, \beta)| |E_{\Phi}(C, y; \vartheta)| \ll |M_{\Phi}(B, y; q, \beta)|^2 + |E_{\Phi}(C, y; \vartheta)|^2$, on voit que le deuxième terme d'erreur de (3.8) donne après intégration un terme

$$\ll_{\varepsilon, \Phi} A^{3/4+\varepsilon/2} \left\{ \Psi(C, y) + \sum_{q \leq C^{1/4}} \varphi(q) \int_{-C^{1-\delta}}^{C^{1-\delta}} |M_{\Phi}(B, y; q, \beta)|^2 d\beta \right\}.$$

Les majorations (3.9) et (3.10) montrent que ceci est

$$\ll_{\varepsilon, \Phi} A^{3/4+\varepsilon/2} \left\{ \Psi(C, y) + (\log B) \Psi(B, y) C^{\varepsilon/3} \right\}.$$

Le dernier terme d'erreur de (3.8) devient après sommation et intégration un terme d'erreur

$$\ll_{\varepsilon, \Phi} C^{3/4+\varepsilon/2} \sum_{q \leq C^{1/4}} \frac{\varphi(q_0)}{\varphi(q_1)} \int_{-C^{\delta-1}}^{C^{\delta-1}} |M_{\Phi}(A, y; q_0, \beta)| |M_{\Phi}(B, y; q_0, \beta)| d\beta$$

et une inégalité de Cauchy–Schwarz ainsi que les calculs faits précédemment montrent que celui-ci est

$$\ll_{\varepsilon, \Phi} C^{3/4+\varepsilon} \sqrt{\Psi(A, y)\Psi(B, y)}.$$

Les hypothèses $A \leq C$ et $B \asymp_{\Phi} C$ que l'on a faites montrent que chacun de ces trois termes d'erreur est

$$\ll_{\varepsilon, \Phi} C^{3/4+\varepsilon} \sqrt{\Psi(A, y)\Psi(B, y)}$$

et on en déduit

$$\begin{aligned} & \int_{\mathfrak{M}} E_{\Phi}(A, y; \vartheta) E_{\Phi}(B, y; \vartheta) E_{\Phi}(C, y; -\vartheta) d\vartheta \\ &= \sum_{q \leq C^{1/4}} \varphi(q) \int_{-C^{\delta-1}}^{C^{\delta-1}} M_{\Phi}(A, y; q, \beta) M_{\Phi}(B, y; q, \beta) M_{\Phi}(C, y; q, -\beta) d\beta \\ & \quad + O_{\varepsilon, \Phi} \left(C^{3/4+2\varepsilon} \sqrt{\Psi(A, y)\Psi(B, y)} \right). \end{aligned} \tag{3.11}$$

On applique la Proposition 3.5 avec $R = C$, pour successivement $x = A$, $x = B$ et $x = C$. On reporte les estimations obtenues pour $M_{\Phi}(A, y; q, \beta)$, $M_{\Phi}(B, y; q, \beta)$ et $M_{\Phi}(C, y; q, \beta)$ dans (3.11). Une étude détaillée des termes d'erreur permet d'écrire,

compte tenu de $B \asymp_{\Phi} C$ et $\alpha_A = \alpha_C + o(1)$,

$$\begin{aligned}
& M_{\Phi}(A, y; q, \beta) M_{\Phi}(B, y; q, \beta) M_{\Phi}(C, y; q, -\beta) \\
&= \frac{\mu(q_1)}{\varphi(q_1)^3} \tilde{M}_{\Phi}(A, y; q_0, \beta) \tilde{M}_{\Phi}(B, y; q_0, \beta) \tilde{M}_{\Phi}(C, y; q_0, \beta) \\
&+ O_{\delta, \Phi} \left(\frac{1}{\varphi(q_1)^3} \frac{q_0^{-\alpha_A - \alpha_B - \alpha_C + 3\delta} \Psi(A, y) \Psi(B, y) \Psi(C, y)}{u_A (1 + |\beta|A)(1 + |\beta|B)(1 + |\beta|C)} \right) \\
&+ O_{\delta, \Phi} \left(\frac{1}{\varphi(q_1)^3} \left\{ q_0^{3/2} A C^{-1/2+4\delta} + \Psi(A, y) q_0^{-1-\alpha_C+\delta} C^{3\delta} \right. \right. \\
&\left. \left. + \Psi(A, y) \Psi(C, y) q_0^{-1/2-2\alpha_C+2\delta} C^{-1/2+2\delta} \right\} \right). \tag{3.12}
\end{aligned}$$

On suppose $(C, y) \in \mathcal{D}(4 + \eta, c_0)$ pour un certain $\eta > 0$ qui garantisse $\alpha_C - 3/4 \geq 3\delta$. On peut vérifier que le choix $\eta = 97\delta$ est valable dès que $\delta \leq 1/24$ pour x et y assez grands. On reporte l'estimation (3.12) dans l'estimation (3.11). On considère tout d'abord le deuxième terme d'erreur. Après intégration et sommation, on obtient un terme

$$\ll_{\delta, \Phi} A C^{-3/8+\delta} + \Psi(A, y) C^{1/4-\alpha_C/4+5\delta} + \Psi(A, y) \Psi(C, y) C^{-1/2+3\delta}.$$

On vérifie alors que ceci est $\ll_{\varepsilon, \Phi} C^{3/4+\varepsilon} \sqrt{\Psi(A, y) \Psi(B, y)}$ quitte à prendre δ assez petit en fonction de ε .

On considère ensuite le premier terme d'erreur de (3.12). Après intégration et sommation, on obtient un terme

$$\begin{aligned}
& \ll_{\delta, \Phi} \int_{-C^{\delta-1}}^{C^{\delta-1}} \frac{d\beta}{(1 + |\beta|A)(1 + |\beta|B)(1 + |\beta|C)} \frac{\Psi(A, y) \Psi(B, y) \Psi(C, y)}{u_A} \\
& \times \sum_{q_0 \in \mathcal{S}(C^{1/4}, y)} \frac{\varphi(q_0)}{q_0^{\alpha_A + \alpha_B + \alpha_C - 3\delta}} \sum_{\substack{q_1 \leq C^{1/4}/q_0 \\ P^-(q_1) > y}} \frac{1}{\varphi(q_1)^2}.
\end{aligned}$$

La somme en q_1 est trivialement bornée. Étant donnée notre hypothèse $\alpha_C - 3/4 \geq 3\delta$, la somme en q_0 est majorée par

$$\sum_{q_0 \geq 1} \varphi(q_0) q_0^{-\alpha_A - \alpha_B - \alpha_C + 3\delta} \ll 1.$$

Enfin, l'intégrale se majore comme suit :

$$\int_{-C^{\delta-1}}^{C^{\delta-1}} \frac{d\beta}{(1 + |\beta|A)(1 + |\beta|B)(1 + |\beta|C)} \ll \frac{1}{C} \int_0^{C^{\delta}} \frac{d\xi}{(1 + \frac{A}{C}\xi)(1 + \frac{B}{C}\xi)(1 + \xi)} \ll_{\Phi} \frac{1}{C}$$

la dernière majoration étant valable en vertu de $B/C \gg_{\Phi} 1$. Le premier terme d'erreur de (3.12) devient donc lorsqu'on le reporte dans (3.11) un terme

$$\ll_{\delta, \Phi} \frac{\Psi(A, y) \Psi(B, y) \Psi(C, y)}{u_A C}.$$

On reporte maintenant le terme principal de (3.12) dans l'estimation (3.11). Une inversion

de Fourier fournit

$$\begin{aligned}
 & \int_{-C^{\delta-1}}^{C^{\delta-1}} \check{\Phi}(\beta A, \alpha_A) \check{\Phi}(\beta B, \alpha_B) \check{\Phi}(-\beta C, \alpha_C) d\beta \\
 &= \frac{1}{C} \int_{-C^\delta}^{C^\delta} \check{\Phi}(\xi A/C, \alpha_A) \check{\Phi}(\xi B/C, \alpha_B) \check{\Phi}(-\xi, \alpha_C) d\xi \\
 &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{\infty} \check{\Phi}(\xi A/C, \alpha_A) \check{\Phi}(\xi B/C, \alpha_B) \check{\Phi}(-\xi, \alpha_C) d\xi + O_\Phi(C^{-1-\delta}) \\
 &= \frac{1}{C} \mathfrak{S}_0(\Phi; A, B, C, y) + O_\Phi(C^{-1-\delta}).
 \end{aligned}$$

Quant à la somme en q , on vérifie que l'hypothèse $\alpha_C - 3/4 \geq 3\delta$ implique

$$\frac{1}{y^{\alpha_A + \alpha_B + \alpha_C - 2} \log y} \ll \frac{1}{u}.$$

On a alors

$$\begin{aligned}
 & \sum_{q_0 \in S(C^{1/4}, y)} \sum_{\substack{q_1 \leq C^{1/4}/q_0 \\ P^-(q_1) > y}} \frac{\mu(q_1)}{\varphi(q_1)^2} \frac{\alpha_A \alpha_B \alpha_C}{q_0^{\alpha_A + \alpha_B + \alpha_C}} \prod_{p|q_0} \left(1 - \frac{p^{\alpha_A} - 1}{p - 1}\right) \left(1 - \frac{p^{\alpha_B} - 1}{p - 1}\right) \left(1 - \frac{p^{\alpha_C} - 1}{p - 1}\right) \\
 &= \sum_{P^+(q_0) \leq y} \sum_{\substack{q_1 \geq 1 \\ P^-(q_1) > y}} \frac{\mu(q_1)}{\varphi(q_1)^2} \frac{\alpha_A \alpha_B \alpha_C}{q_0^{\alpha_A + \alpha_B + \alpha_C}} \prod_{p|q_0} \left(1 - \frac{p^{\alpha_A} - 1}{p - 1}\right) \left(1 - \frac{p^{\alpha_B} - 1}{p - 1}\right) \left(1 - \frac{p^{\alpha_C} - 1}{p - 1}\right) \\
 &+ O_\delta(C^{1/4(2+\delta-\alpha_A-\alpha_B-\alpha_C)})
 \end{aligned}$$

où l'hypothèse $\alpha_C - 3/4 \geq 3\delta$ implique que l'exposant dans le terme d'erreur est $\leq -1/16$. La somme en q_1 vérifie

$$\sum_{\substack{q_1 \geq 1 \\ P^-(q_1) > y}} \frac{\mu(q_1)}{\varphi(q_1)^2} = 1 + O\left(\frac{1}{y \log y}\right)$$

et pour la somme en q_0 on a

$$\begin{aligned}
 & \sum_{P^+(q_0) \leq y} q_0^{-\alpha_A - \alpha_B - \alpha_C} \prod_{p|q_0} \left(1 - \frac{p^{\alpha_A} - 1}{p - 1}\right) \left(1 - \frac{p^{\alpha_B} - 1}{p - 1}\right) \left(1 - \frac{p^{\alpha_C} - 1}{p - 1}\right) \\
 &= \prod_{p \leq y} \left(1 + \frac{p - 1}{p(p^{\alpha_A + \alpha_B + \alpha_C - 1} - 1)} \left(\frac{p - p^{\alpha_A}}{p - 1}\right) \left(\frac{p - p^{\alpha_B}}{p - 1}\right) \left(\frac{p - p^{\alpha_C}}{p - 1}\right)\right) \\
 &= \mathfrak{S}_1(A, B, C, y) + O\left(\frac{1}{y^{\alpha_A + \alpha_B + \alpha_C - 2} \log y}\right).
 \end{aligned}$$

On utilise $\mathfrak{S}_0(\Phi; A, B, C, y) \ll 1$ et $\mathfrak{S}_1(A, B, C, y) \ll 1$ et on choisit δ suffisamment petit, en fonction de ε , afin d'obtenir

$$\begin{aligned}
 & \int_{\mathfrak{M}} E_\Phi(A, y; \vartheta) E_\Phi(B, y; \vartheta) E_\Phi(C, y; -\vartheta) d\vartheta \\
 &= \mathfrak{S}_0 \mathfrak{S}_1 \frac{\Psi(A, y) \Psi(B, y) \Psi(C, y)}{C} + O_{\varepsilon, \Phi} \\
 &\times \left(C^{3/4+\varepsilon} \sqrt{\Psi(A, y) \Psi(B, y)} + \frac{\Psi(A, y) \Psi(B, y) \Psi(C, y)}{u_A C} \right)
 \end{aligned}$$

et donc

$$N(A, B, C, y; \Phi) = \mathfrak{S}_0 \mathfrak{S}_1 \frac{\Psi(A, y) \Psi(B, y) \Psi(C, y)}{C} \\ + O_{\varepsilon, \Phi} \left(C^{3/4+\varepsilon} \sqrt{\Psi(A, y) \Psi(B, y)} + \frac{\Psi(A, y) \Psi(B, y) \Psi(C, y)}{u_A C} \right)$$

ce qui achève la démonstration du théorème.

4. Solutions primitives pondérées et solutions non pondérées

4.1. Étude des solutions primitives pondérées

On montre dans cette partie la deuxième assertion du Théorème 1.3. Soit $c_0 > 0$ la constante absolue donnée par le Théorème 3.1. Soit $\varepsilon > 0$ et $(x, y) \in \mathcal{D}(8 + \varepsilon, c_0)$. Une inversion de Möbius fournit

$$N^*(x, y; \Phi) = \sum_{P^+(d) \leq y} \mu(d) N\left(\frac{x}{d}, y; \Phi\right).$$

On pose $D_0 = x^{\delta_0}$ avec

$$\delta_0 = \frac{1 + \varepsilon - \alpha}{2\alpha - 1}$$

de sorte que $D_0^{1-2\alpha} \ll \Psi(x, y) x^{-1-\varepsilon/2}$. Dans le domaine $\mathcal{D}(8 + \varepsilon, c_0)$, on a $\alpha - 2/3 \gg 1$ donc pour ε suffisamment petit les inégalités $0 < \delta_0 < 1$, $1 \ll \delta_0$ et $1 \ll 1 - \delta_0$ sont valables. Lorsque $d > D_0$, on utilise la majoration triviale

$$N(x/d, y; \Phi) \ll_{\Phi} \Psi(Kx/d, y)^2 \ll_{\Phi} d^{-2\alpha} \Psi(x, y)^2$$

où K est tel que le support de Φ est inclus dans $]0, K]$. On a donc

$$\sum_{\substack{P^+(d) \leq y \\ d > D_0}} \mu(d) N\left(\frac{x}{d}, y; \Phi\right) \ll_{\Phi} \Psi(x, y)^2 \sum_{D_0 < d \leq Kx} d^{-2\alpha} \\ \ll \Psi(x, y)^2 D_0^{1-2\alpha} \ll \frac{\Psi(x, y)^3}{x^{1+\varepsilon/2}}$$

qui est bien inclus dans le terme d'erreur de (1.5). Lorsque $d \leq D_0$, on a $\log(x/d) \gg \log x$ ce qui implique que x/d est dans le domaine $\mathcal{D}(8 + \varepsilon, c_0)$ quitte à prendre c_0 suffisamment petit. On peut donc utiliser l'estimation (1.4) et écrire

$$N^*(x, y; \Phi) = \sum_{\substack{P^+(d) \leq y \\ d \leq D_0}} \mu(d) \mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha_{x/d}) \mathfrak{S}_1(\alpha_{x/d}) \frac{\Psi(x/d, y)^3}{x/d} \left\{ 1 + O_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{1}{u_{x/d}} \right) \right\} \\ + O_{\Phi} \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{x^{1+\varepsilon}} \right).$$

On note que $u_{x/d} \asymp u$ pour $d \leq D_0$, ainsi que $\sum_{d \geq 1} d^{1-3\alpha} \ll 1$. On a donc

$$N^*(x, y; \Phi) = \sum_{\substack{P^+(d) \leq y \\ d \leq D_0}} \mu(d) \mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha_{x/d}) \mathfrak{S}_1(\alpha_{x/d}) \frac{\Psi(x/d, y)^3}{x/d} + O_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{ux} \right).$$

Soit $D_1 = u^{1/(3\alpha-2)}$. L'inégalité $\alpha - 2/3 \gg 1$ fournit

$$\sum_{d>D_1} d^{1-3\alpha} \ll \frac{1}{u} \quad (4.1)$$

et ainsi

$$N^*(x, y; \Phi) = \sum_{\substack{P^+(d) \leq y \\ d \leq D_1}} \mu(d) \mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha_{x/d}) \mathfrak{S}_1(\alpha_{x/d}) \frac{\Psi(x/d, y)^3}{x/d} + O_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{ux} \right).$$

Il est montré dans [3, équation 6.6] que l'on a

$$\alpha_{x/d} - \alpha \ll \frac{\log d}{u(\log y)^2}.$$

Dans le domaine $\mathcal{D}(8 + \varepsilon, c_0)$ et lorsque $d \leq D_1$

$$\frac{\log d}{u(\log y)^2} \ll \frac{\log u}{u(\log y)^2} \ll \frac{1}{u}.$$

On vérifie d'une part par convergence dominée que $(\partial \mathfrak{S}_0 / \partial \alpha)(\Phi, \alpha) \ll 1$, d'autre part en considérant la dérivée logarithmique que $\mathfrak{S}'_1(\alpha) \ll 1$. On a donc

$$\mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha_{x/d}) = \mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha) + O \left(\frac{\log d}{u(\log y)^2} \right)$$

$$\mathfrak{S}_1(\alpha_{x/d}) = \mathfrak{S}_1(\alpha) + O \left(\frac{\log d}{u(\log y)^2} \right).$$

Il vient

$$N^*(x, y; \Phi) = \mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha) \mathfrak{S}_1(\alpha) \sum_{\substack{P^+(d) \leq y \\ d \leq D_1}} \mu(d) \frac{\Psi(x/d, y)^3}{x/d} + O_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{ux} \right).$$

On a ensuite $t = (\log d) / \log y \ll (\log u) / \log y \ll 1$. L'estimation du Lemme 2.7 fournit donc

$$\Psi \left(\frac{x}{d}, y \right) = \left\{ 1 + O \left(\frac{1}{u} \right) \right\} \frac{\Psi(x, d)}{d^\alpha}$$

et ainsi

$$\begin{aligned} N^*(x, y; \Phi) &= \mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha) \mathfrak{S}_1(\alpha) \frac{\Psi(x, y)^3}{x} \sum_{\substack{P^+(d) \leq y \\ d \leq D_1}} \frac{\mu(d)}{d^{3\alpha-1}} + O_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{ux} \right) \\ &= \frac{\mathfrak{S}_0(\Phi, \alpha) \mathfrak{S}_1(\alpha)}{\zeta(3\alpha - 1, y)} \frac{\Psi(x, y)^3}{x} + O_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{ux} \right) \end{aligned}$$

en vertu encore une fois de (4.1). Ceci montre l'estimation (1.5) et achève la démonstration du Théorème 1.3.

4.2. Étude des solutions non pondérées

On montre dans cette section l'estimation (1.6). L'estimation (1.7) s'ensuit par une méthode identique à celle de la section précédente, simplifiée par le fait qu'on ne se

préoccupe plus de la taille du terme d'erreur. Lorsque (x, y) vérifie les hypothèses du Théorème 1.1, on a $(\log u)/\log y \ll 1/u$ ainsi que $\alpha = 1 + O((\log u)/\log y)$ ce qui implique

$$\mathfrak{S}_0(\mathbf{1}_{[0,1]}, \alpha) \mathfrak{S}_1(\alpha) = \frac{1}{2} + O\left(\frac{\log u}{\log y}\right)$$

et l'estimation (1.6) découle donc du Théorème 1.1.

On suppose donc que (x, y) ne vérifie pas les hypothèses du Théorème 1.1 pour par exemple $\varepsilon = 1/6$, en particulier, pour tout c_0 fixé on a $(\log y)H(u)^{-c_0} \leq 1$ pour x et y assez grands. Il s'agit d'établir la borne supérieure de l'estimation (1.6), puisque la borne inférieure est montrée dans [5].

Soit $\varepsilon > 0$. On part de l'expression

$$N(x, y) = \sum_{\substack{\mathbf{k} \in \mathbb{N}^3 \\ k_1 \geq k_3 \\ k_2 \geq k_3}} N(x2^{-k_1}, x2^{-k_2}, x2^{-k_3}, y; \mathbf{1}_{[1/2,1]})$$

où on a noté $\mathbf{k} = (k_1, k_2, k_3)$.

Soit K_0 tel que que $2^{K_0} = x^{\delta_0}$, avec $\delta_0 = 1/\alpha - 1 + \varepsilon$, de sorte que $2^{-\alpha K_0} = o(\Psi(x, y)x^{-1})$. Alors par une majoration triviale et l'utilisation du Lemme 2.7 on a

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{\mathbf{k} \in \mathbb{N}^3 \\ \max(k_1, k_2) \geq K_0}} N(x2^{-k_1}, x2^{-k_2}, x2^{-k_3}, y; \mathbf{1}_{[1/2,1]}) &\ll N(x2^{-K_0}, x, x, y; \mathbf{1}_{[0,1]}) \\ &\ll 2^{-\alpha K_0} \Psi(x, y)^2 = o\left(\frac{\Psi(x, y)^3}{x}\right). \end{aligned}$$

On a donc

$$N(x, y) = \sum_{\substack{\mathbf{k} \in \mathbb{N}^3 \\ K_0 \geq k_1 \geq k_3 \\ K_0 \geq k_2 \geq k_3}} N(x2^{-k_1}, x2^{-k_2}, x2^{-k_3}, y; \mathbf{1}_{[1/2,1]}) + o\left(\frac{\Psi(x, y)^3}{x}\right).$$

On fixe $\delta > 0$ et on choisit une fonction Φ de classe \mathcal{C}^∞ vérifiant $\mathbf{1}_{[1/2,1]} \leq \Phi \leq \mathbf{1}_{[(1-\delta)/2, 1+\delta]}$. On a

$$N(x, y) \leq \sum_{\substack{\mathbf{k} \in \mathbb{N}^3 \\ K_0 \geq k_1 \geq k_3 \\ K_0 \geq k_2 \geq k_3}} N(x2^{-k_1}, x2^{-k_2}, x2^{-k_3}, y; \Phi) + o\left(\frac{\Psi(x, y)^3}{x}\right).$$

On note pour simplifier $A := x2^{-k_1}$, $B := x2^{-k_2}$, $C := x2^{-k_3}$. On peut appliquer le Théorème 3.1. Soient $c_0 > 0$ la constante absolue et $\eta = \eta(\varepsilon) > 0$ le réel donné par le théorème, et supposons $(x, y) \in \mathcal{D}(4 + \eta)$. On a alors $\alpha - 1/2 \gg 1$ donc $(\log A)/(\log C) \gg 1$ pour tous les indices k_1, k_3 vérifiant $k_1 \leq K_0$ et $k_3 \geq 0$. On vérifie ensuite que quitte à diminuer la constante absolue c_0 dans la définition de $\mathcal{D}(4 + \eta)$, on a $(A, y), (B, y), (C, y) \in \mathcal{D}(4 + \eta)$ lorsque $0 \leq k_1, k_2, k_3 \leq K_0$: pour ces valeurs des indices, l'estimation (3.6) est donc valable. En remarquant de plus que

$$\sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{N}^3} C^{3/4+\varepsilon} \sqrt{\Psi(A, y)\Psi(B, y)} \ll x^{3/4+\varepsilon} \Psi(x, y)$$

on en déduit

$$N(x, y) \leq \sum_{\substack{\mathbf{k} \in \mathbb{N}^3 \\ K_0 \geq k_1 \geq k_3 \\ K_0 \geq k_2 \geq k_3}} \mathfrak{S}_1(A, B, C, y) \mathfrak{S}_0(\Phi; A, B, C, y) \frac{\Psi(A, y) \Psi(B, y) \Psi(C, y)}{C} \\ + O_{\varepsilon, \Phi} \left(x^{3/4+\varepsilon} \Psi(x, y) \right) + o \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{x} \right).$$

On choisit $\varepsilon \leq 1/48$ et tel que $4 + \eta(\varepsilon) \leq 8$. On suppose $(x, y) \in \mathcal{D}(8 + 384\varepsilon)$, et on a alors de la même façon que dans la formule (3.7),

$$x^{3/4+\varepsilon} \Psi(x, y) = o \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{x} \right).$$

On pose $K_1 = \lfloor \log y / \log 2 \rfloor$ de sorte que $2^{K_1} \asymp y$. Pour les valeurs des indices sur lesquelles on somme, on a

$$\mathfrak{S}_1(A, B, C, y) \mathfrak{S}_0(\Phi; A, B, C, y) \ll 1.$$

La contribution des indices vérifiant $\max(k_1, k_2) \geq K_1$ est donc

$$\ll \sum_{\substack{\mathbf{k} \in \mathbb{N}^3 \\ k_2 \geq k_3 \\ k_1 \geq K_1}} \frac{\Psi(x 2^{-k_1}, y) \Psi(x 2^{-k_2}, y) \Psi(x 2^{-k_3}, y)}{x 2^{-k_3}} \\ \ll \frac{\Psi(x, y)^3}{x} \sum_{\substack{\mathbf{k} \in \mathbb{N}^3 \\ k_2 \geq k_3 \\ k_1 \geq K_1}} 2^{-\alpha_A k_1 - \alpha_B k_2 + (1 - \alpha_C) k_3} \\ \ll \frac{\Psi(x, y)^3}{x} 2^{-\alpha K_1} \sum_{k_3 \geq 0} 2^{(1 - 2\alpha) k_3} = o \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{x} \right).$$

Ainsi

$$N(x, y) \leq \sum_{\substack{\mathbf{k} \in \mathbb{N}^3 \\ K_1 \geq k_1 \geq k_3 \\ K_1 \geq k_2 \geq k_3}} \mathfrak{S}_1(A, B, C, y) \mathfrak{S}_0(\Phi; A, B, C, y) \frac{\Psi(A, y) \Psi(B, y) \Psi(C, y)}{C} \\ + o_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{x} \right).$$

En utilisant la définition (3.5) on écrit

$$\mathfrak{S}_0(\Phi; A, B, C, y) = \alpha_A \alpha_B \alpha_C 2^{\alpha_A k_1} 2^{\alpha_B k_2} 2^{(\alpha_C - 1) k_3} \\ \times \int_0^\infty \int_0^\infty \Phi(v_1 2^{k_1}) \Phi(v_2 2^{k_2}) \Phi((v_1 + v_2) 2^{k_3}) v_1^{\alpha_A - 1} v_2^{\alpha_B - 1} (v_1 + v_2)^{\alpha_C - 1} dv_1 dv_2$$

où l'on a effectué les changements de variables $t_1 \leftarrow v_1 2^{k_1}$ et $t_2 \leftarrow v_2 2^{k_2}$. Pour les valeurs que parcourent les indices k_1, k_1 et k_3 on a

$$\max(|\alpha_A - \alpha|, |\alpha_B - \alpha|, |\alpha_C - \alpha|) \ll 1/(\log x).$$

En particulier on a

$$\mathfrak{S}_1(A, B, C, y) \sim \mathfrak{S}_1(\alpha).$$

Quant à la double intégrale, son intégrande est à support compact inclus dans $[0, 1 + \delta]^2$, et pour $v_1, v_2 \leq 1 + \delta$ on a

$$v_1^{\alpha_A-1} v_2^{\alpha_B-1} (v_1 + v_2)^{\alpha_C-1} \sim (v_1 v_2 (v_1 + v_2))^{\alpha-1}.$$

On a donc

$$\begin{aligned} N(x, y) &\leq \mathfrak{S}_1(\alpha) \alpha^3 \sum_{\substack{\mathbf{k} \in \mathbf{N}^3 \\ K_1 \geq k_1 \geq k_3 \\ K_1 \geq k_2 \geq k_3}} 2^{\alpha_A k_1} 2^{\alpha_B k_2} 2^{(\alpha_C-1)k_3} \frac{\Psi(A, y) \Psi(B, y) \Psi(C, y)}{C} \\ &\quad \times \int_0^\infty \int_0^\infty \Phi(v_1 2^{k_1}) \Phi(v_2 2^{k_2}) \Phi((v_1 + v_2) 2^{k_3}) (v_1 v_2 (v_1 + v_2))^{\alpha-1} dv_1 dv_2 \\ &\quad + o_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{x} \right). \end{aligned}$$

Le Lemme 2.7 avec l'inégalité $K_1 \ll \log y$ fournit uniformément lorsque $0 \leq k_1, k_2, k_3 \leq K_1$ les équivalents

$$\Psi(A, y) \sim 2^{-\alpha_A k_1} \Psi(x, y)$$

$$\Psi(B, y) \sim 2^{-\alpha_B k_2} \Psi(x, y)$$

$$\Psi(C, y) \sim 2^{-\alpha_C k_3} \Psi(x, y)$$

de sorte que

$$\begin{aligned} N(x, y) &\leq \mathfrak{S}_1(\alpha) \alpha^3 \frac{\Psi(x, y)^3}{x} \\ &\quad \times \sum_{\substack{\mathbf{k} \in \mathbf{N}^3 \\ K_1 \geq k_1 \geq k_3 \\ K_1 \geq k_2 \geq k_3}} \int_0^\infty \int_0^\infty \Phi(v_1 2^{k_1}) \Phi(v_2 2^{k_2}) \Phi((v_1 + v_2) 2^{k_3}) (v_1 v_2 (v_1 + v_2))^{\alpha-1} dv_1 dv_2 \\ &\quad + o_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{x} \right). \end{aligned}$$

Soit $v \in \mathbf{R}$. De la majoration $\Phi \leq \mathbf{1}_{|(1-\delta)/2, 1+\delta]}$ on déduit, quitte à supposer $\delta < 1/2$,

$$\sum_{k \geq 0} \Phi(v 2^k) \leq \mathbf{1}_{]0, 1]}(v) + \mathbf{1}_{I_\delta}(v)$$

où on a noté $I_\delta = \bigcup_{k \geq 0} [(1-\delta)2^{-k}, (1+\delta)2^{-k}]$. Alors, en étendant la somme sur chaque indice à \mathbf{N} , on a

$$\begin{aligned} &\sum_{\mathbf{k} \in \mathbf{N}^3} \int_0^\infty \int_0^\infty \Phi(v_1 2^{k_1}) \Phi(v_2 2^{k_2}) \Phi((v_1 + v_2) 2^{k_3}) (v_1 v_2 (v_1 + v_2))^{\alpha-1} dv_1 dv_2 \\ &\leq \int_0^1 \int_0^{1-t_2} (t_1 t_2 (t_1 + t_2))^{\alpha-1} dt_1 dt_2 \\ &\quad + O \left(\int_{I_\delta} \int_0^1 (t_1 t_2 (t_1 + t_2))^{\alpha-1} dt_1 dt_2 + \int_0^1 \int_0^1 \mathbf{1}_{I_\delta}(t_1 + t_2) (t_1 t_2 (t_1 + t_2))^{\alpha-1} dt_1 dt_2 \right). \end{aligned}$$

Par convergence dominée, le terme d'erreur tend vers 0 avec δ . On dispose donc d'une

fonction $f(\delta)$ qui tend vers 0 telle que

$$N(x, y) \leq (1 + f(\delta)) \mathfrak{S}_0(\mathbf{1}_{[0,1]}, \alpha) \mathfrak{S}_1(\alpha) \frac{\Psi(x, y)^3}{x} + o_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{x} \right)$$

ce qui implique bien la majoration

$$N(x, y) \leq \mathfrak{S}_0(\mathbf{1}_{[0,1]}, \alpha) \mathfrak{S}_1(\alpha) \frac{\Psi(x, y)^3}{x} + o_{\varepsilon, \Phi} \left(\frac{\Psi(x, y)^3}{x} \right).$$

Cela montre la première assertion du Théorème 1.5, compte tenu de

$$\mathfrak{S}_0(\mathbf{1}_{[0,1]}, \alpha) \mathfrak{S}_1(\alpha) \gg 1.$$

Acknowledgment. L'auteur souhaite adresser ses meilleurs remerciements à son directeur de thèse, Régis de la Bretèche, pour sa grande disponibilité et ses nombreux conseils durant la rédaction de cet article, ainsi qu'à Andrew Granville pour sa relecture et ses remarques.

REFERENCES

- [1] R. DE LA BRETÈCHE and G. TENENBAUM. Propriétés statistiques des entiers friables. *The Ramanujan J.* **9**, 1 (2005), 139–202.
- [2] R. DE LA BRETÈCHE and A. GRANVILLE. Densité des friables. *Bull. Soc. Math. France*, à paraître.
- [3] A. HILDEBRAND and G. TENENBAUM. On integers free of large prime factors. *Trans. Amer. Math. Soc.* **296**, 1 (1986), 265–290.
- [4] J. C. LAGARIAS and K. SOUNDARARAJAN. Smooth solutions to the abc equation: the xyz Conjecture. *J. Théor. Nombres Bordeaux* **23**, 1 (2009), 209–234.
- [5] J. C. LAGARIAS and K. SOUNDARARAJAN. Counting smooth solutions to the equation $A + B = C$. *Proc. London Math. Soc.* **104**, 4 (2012), 770–798.
- [6] J. OESTERLÉ. Nouvelles approches du “théoreme” de Fermat, Séminaire Bourbaki no. 694 (1987-88). *Astérisque* **161-162** (1988), 165–186.